

# 紅火蟻叮咬後之處置

文章來源：教育部校外來種及動植物疫病防治輔導團

## 如何避免被紅火蟻叮咬

入侵紅火蟻是一種擁有攻擊性的昆蟲，而入侵紅火蟻有保護巢穴的行為，所以當巢穴遭受到外界擾動時就會看見傾巢而出的紅火蟻攻擊敵人以保護巢穴。所以要自保的第一個方法即是，當在野外發現入侵紅火蟻蟻巢時，千萬不要去驚擾蟻巢。大自然中的必然定律：所有生命的和平共處，其實不論是紅火蟻蟻巢或是掛在樹上的蜂窩，沒有太過強烈的驚擾，這些生物也不會主動攻擊敵人。人唯有尊重自然，大自然中的一切也會尊重你。若是在家中私人庭院或其他戶外區域發現紅火蟻的個體，則可以自行使用是面上販售之含有合成除蟲菊或其他有效成份的噴霧劑，噴灑的路徑主要是沿牆腳或螞蟻行走的路線噴灑，另外，定期在家中門框或窗框噴灑藥劑成防護帶，讓螞蟻無法進入室內。室內的部分則可利用市面上在販售滅螞蟻之餌劑，一般的大賣場或量販店皆可找到，並注意使用期限定期更換，才能真正的杜絕居家環境中的螞蟻。有些住宅戶外區有草皮之部分也要時常注意避免入侵紅火蟻的入侵，以減少居家環境的危安。

在農地工做的農友在工作時盡量穿著長靴，避免赤腳在田裡工作，並時時注意是否有入侵紅火蟻的入侵，以防止不小心踩到蟻丘，造成自身的危險。當農地或自家環境週遭裡發現紅火蟻蹤跡時，請盡速通報相關單位知情。國家紅火蟻中心 紅火蟻通報專線：0800-095-590。

## 紅火蟻小檔案

學名：入侵紅火蟻 (*Solenopsis invicta*)


類別：蟻科昆蟲，火蟻類

來源：南美洲，然後擴散至美洲、澳洲和中國等地

體形：約3-6毫米，腹錘節有毒囊貯存毒液，尾部則有螫針可連續猛刺被咬住的獵物

繁殖力：紅火蟻后每日可產卵數千，壽命6至7年

殺傷力：人類被咬，輕則疼痛、出現水泡；嚴重會出現過敏反應，呼吸困難甚至休克致死



資源來源：《蘋果》資料室

## 入侵紅火蟻叮咬後處理

- (1) 先冰敷處理被叮咬的部位，並以肥皂與清水清洗被叮咬的患部。
- (2) 請在醫生診斷指示下使用含類固醇的外敷藥膏或是口服抗組織胺藥劑來緩解搔癢與腫脹的症狀。
- (3) 被叮咬後儘量避免將膿胞弄破，避免傷口的二次感染。
- (4) 若是有過敏病史或叮咬後有較劇烈的反應，如全身性搔癢、蕁麻疹、臉部燥紅腫脹、呼吸困難、胸痛、心跳加快等症狀或其他特殊生理反應時，必須盡速至醫療院所就醫。